

การศึกษาชีวนิสัของยุงแมนโซเนีย ในจังหวัดนราธิวาส
Study on Bionomic of Mansonia mosquitoes in Narathiwat

กอบกาญจน์ กาญจนภาศ¹ หมัดไสด อัครเดชาวุฒิ²
มานิต ดำรงวุฒิ² ถาวร ดุลย์เกริ³
สมะแอ ปือราเฮง⁴ สุนทร ขำเอี่ยม⁵

บทคัดย่อ

ชีวนิสัการออกหากินของยุง Mansonia 4 ชนิด คือ M. bonneae M. dives , M.indiana และ M. uniformis ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส มีช่วงเวลาออกหากินที่ต่างกัน โดยอาศัยมีปัจจัยเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ หรือกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยุง M.bonneae และ M.dives ชอบกัดกินเลือดคนมากกว่าวัวถึง 3:1 และยุงดังกล่าวยังชอบเลือกกัดช่วงเช้า-ปลายเท้ามากกว่ายุง Mansonia ชนิดอื่น ๆ

-
1. กองโรคเท้าช้าง
 2. ศูนย์โรคเท้าช้างเขต 4 กาญจนบุรี
 3. ศูนย์โรคเท้าช้างเขต 11 นครศรีธรรมราช
 4. ศูนย์โรคเท้าช้างเขต 12 ปัตตานี
 5. ศูนย์โรคเท้าช้างเขต 111 สุราษฎร์ธานี